



RECOMMANDATIONS POUR UNE CHIRURGIE MUCCO GINGIVALE

Nous vous prions de suivre attentivement ces instructions.

Si vous avez des questions ou des interrogations, vous pouvez contacter le secrétariat par téléphone au 03.20.25.44.59 ou par mail à l'adresse secretariat@cabdentaireducentre.fr

Une intervention de chirurgie buccale nécessite certaines précautions post-opératoires pour assurer une cicatrisation rapide et éviter les complications.

CHIRURGIE MUCCO GINGIVALE	
1	HYGIENE BUCCAL Ne pas brosser les dents au niveau de la zone opérée avant la dépose des points Débuter les bains de bouche prescrits 48h après l'intervention. Ne débiter le brossage qu'avec la brosse souple prescrite et un geste léger, après la dépose des fils de suture ou 10 jours post opératoire. Evitez jusque-là l'emploi du fil dentaire ou de la brossette.
2	ALIMENTATION Mangez des aliments mous , mais comme des œufs nourrissants (vitaminés), de la viande hachée, des pâtes, de la purée, des fromages, des compotes. Evitez les aliments et les liquides trop chaud, acidulés et pimentés, selon la période définie.
3	OEDEME Une intervention de chirurgie buccale peut entraîner une tuméfaction (gonflement de la joue ou de la lèvre) plus ou moins importante. C'est une réaction normale de l'organisme traitée par les médicaments qui vous ont été prescrits. Pour limiter l'œdème, vous pouvez appliquer une vessie de glace (ou des glaçons enveloppés dans un linge) sur le côté du visage atteint, pendant une dizaine de minutes toutes les demi-heures, et ce pendant les 3 heures suivant l'intervention. N'utilisez pas de compresse chaude. L'œdème éventuel commencera à disparaître entre le 3 ^{ème} et le 7 ^{ème} jour suivant l'intervention.

4	LEGER SAIGNEMENT Un saignement éventuel peut persister pendant les premières 24 heures. S'il devenait important, placez directement sur l'endroit qui saigne 1 ou 2 compresses de gaze stériles et maintenez une pression ferme (avec les dents ou le doigt) pendant 10 minutes au moins. Il est fortement déconseillé de fumer et de consommer des boissons alcoolisées ou des liquides chauds. Si malgré ces précautions, le saignement persiste, prévenez-nous ou éventuellement, prévenez votre médecin.
5	DOULEUR Elle peut survenir après une intervention de chirurgie buccale. Son intensité est très variable d'une personne à une autre et selon la nature de l'intervention. Elle est traitée par les médicaments qui vous ont été prescrits. Si la prescription s'avère insuffisante ou si vous souffrez de façon intense pendant plus de 48 heures, veuillez nous appeler.



L'équipe du Cabinet Dentaire du Centre vous souhaite un bon rétablissement et reste à votre écoute pour toute question ou demande particulière.